

## УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!!!

Обратите особое внимание!



Полиомиелит относится к **острым инфекционным заболеваниям** вирусной этиологии и характеризуется разнообразием клинических форм вплоть до паралитических. **Паралитические формы** проявляются развитием вялых парезов/параличей конечностей, мимической мускулатуры или мышц туловища.

**Источником инфекции** является человек - **больной или носитель**.

**Основной механизм передачи возбудителя** - фекально-оральный, пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой. Эпидемиологическое значение имеет механизм передачи возбудителя с воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями передачи.

В соответствии с пунктом 2513 СанПиН 3.3686-21 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее трех доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми оральной полиовирусной вакциной (далее - ОПВ), в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. Целью разобщения является предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (непривитого) ребенка, когда исключается риск заражения.

Ограждение вакцинированных от невакцинированных детей направлено на защиту жизни и здоровья населения, позволяет соблюсти баланс интересов как лиц, решивших провести вакцинацию в целях защиты от угрозы возникновения и распространения эпидемии, так и лиц, воспользовавшихся предоставленным законом правом и отказавшихся от профилактической прививки.